

## **Avian and Exotic Animal Clinic**

9330 Waldemar Road Indianapolis, IN 46268

[www.exoticvetclinic.com](http://www.exoticvetclinic.com) (317) 879-8633

### **Cuidados de la Coral Ratonera**

#### **Introducción:**

Desde la región de Maine en el noreste de los EEUU hasta Ecuador de Sudamérica se encuentra una de las especies de serpientes más extensamente distribuida. Estas serpientes ocupan diversos hábitats desde desiertos hasta junglas, desde nivel del mar hasta en las Colinas de las montañas. La mayor parte de especies norteamericanas no exceden las 30 pulgadas de longitud pero la falsa coral oriental puede llegar hasta 3 pies. La subespecie más grande de Centro y Sudamérica pueden exceder las 48 pulgadas en longitud. Pueden llegar a vivir hasta 18 años. Una de las cosas que las hace tan atractivas como mascotas es su atractiva variación del rojo, su color negro y blanco.

#### **Requerimientos en Cautividad:**

Las falsas corales deben alojarse en acuarios grandes con tapas a prueba de escapes. Las temperaturas deben estar entre 80°-83°F y nunca bajar por debajo de 75°F por la noche. El sustrato más limpio es el periódico aunque la alfombra de reptil también puede ser una opción. Evite el uso de arena ya que pueden causar infecciones de piel e impactaciones. Como mobiliario puede colocar una caja como escondite para darle una sensación de seguridad. Puede usar una caja de cartón o papel o la mitad de una maceta, o si no un contenedor de plástico. Debe procurarle un bol con agua lo suficientemente grande como para que se sumerja completamente si es necesario.

#### **Dieta:**

En la Naturaleza son oportunistas, por lo que se alimentan cuando pueden, aunque tienen una mayor prioridad los pequeños mamíferos y lagartos. Aquellas en cautividad se alimentan bien de ratones aunque muchas responderán mejor ante una presa de lagarto. La mayoría de adultos aceptan presa congelada pero muchos juveniles y algunos adultos pueden tener una mayor preferencia por aquellas recién muertas. Recomendamos las congeladas para reducir el riesgo de herida de la serpiente.